

L'Initiative HSH



www.amfar.org/msm

Le VIH/SIDA parmi les homosexuels : Une épidémie grandissante dans l'ombre

L'épidémie du VIH/SIDA entrant dans son deuxième quart de siècle, le VIH demeure toujours une crise parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH), particulièrement dans les milieux à ressources limités. Après l'horrible perte de vies humaines parmi les homosexuels dans les années 1980 et 1990, il nous semble impossible qu'un tel scénario puisse se répéter de nos jours. Par contre, actuellement, la discrimination envers les HSH et la

dénégation de l'existence de relations sexuelles homme-homme continuent d'alimenter cette crise sanitaire importante, comme elles l'ont fait pendant les premières heures de l'infection VIH/SIDA.

“Les programmes qui marchent pour les HSH sont ceux où les groupes à base communautaires ont été dotés du pouvoir pour faire du progrès eux-mêmes.”

– Ashok Row Kavi,
Fondateur, Humsafar Trust

Même aujourd'hui, la transmission du VIH parmi les HSH n'est pas pistée dans la plupart des pays; cependant, les données disponibles indiquent une menace répandue et croissante qui pourrait faire du mal à la population HSH à travers le monde et qui pourrait être à l'origine de nouvelles épidémies générales.

Une population ignorée

Globalement, moins d'un HSH sur 20 a accès aux services de prévention, traitement et soin du VIH/SIDA. Une étude dans 16 pays dans la région Asie-Pacifique a démontré que pas plus de 2% des HSH dans ces pays ont accès aux programmes de prévention du VIH/SIDA. Dans la plupart des pays en voie de développement, les méthodes de prévention du VIH/SIDA visent le grand public. Tandis que les pays commencent à reconnaître qu'il faut lutter contre le VIH/SIDA dans des groupes vulnérables facilement identifiés, tel que les prostitués et les utilisateurs de drogues à injections, les HSH sont encore généralement ignorés. Puisque les financements bilatéraux et les subventions du Fonds Mondial contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme passent principalement par les gouvernements locaux, les programmes HSH bénéficient rarement de cette aide.

Le stigma et la criminalisation alimentent une crise

La législation contre les relations sexuelles homme-homme existe dans 85 pays à travers le monde. Même dans les pays sans interdiction officielle, une stigmatisation répandue empêche souvent les HSH de rechercher ou de recevoir les services essentiels de prévention et de soins du VIH/SIDA. A cause du manque de messages de santé et de supports appropriés, des HSH s'engagent, sans le savoir, dans des activités qui peuvent augmenter leur risque d'infection VIH/SIDA. Dans certaines régions, près de la moitié des hommes disent qu'ils n'ont jamais utilisés un préservatif au cours d'une relation sexuelle homme-homme.


Débuts de changement

La discrimination a conduit la crise de VIH/SIDA parmi les HSH hors de la vue publique, mais cela commence à changer. Les mouvements locaux se forment en Afrique, en Inde, en Asie du Sud Est, et dans d'autres régions en voie de développement où la discrimination est banale et l'épidémie est devenue une crise. Un reportage récent de l'ONUSIDA, la Commission des Droits de International Gay et Lesbienne, amfAR, et d'autres, a attiré l'attention du monde sur l'ampleur du problème. Le Forum Mondial sur le SIDA et les HSH, une collaboration internationale entre les groupes d'HSH et des individus dans quelques pays, se forma récemment pour coordonner les efforts de plaidoyer. Mais, pour vraiment diminuer la propagation du VIH/SIDA parmi les HSH une plus grande prise de conscience, un leadership accru et une augmentation de subvention dans tous les pays seront exigés.

“[Le manque de services du VIH pour les HSH] est un problème grave; le repositionnement doit être parmi les plus grandes priorités... puisque nous désirons atteindre l'accès universel à la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH....”

– Purnima Mane, Directeur des Politiques, Evidence et Partenariat ONUSIDA, 2006

TAUX DE SERO PRÉVALENCE AU VIH APPROXIMATIF PARMI LES HSH DANS CERTAINS PAYS:



L'Initiative HSH

Afin de beaucoup réduire la transmission de l'infection VIH/SIDA parmi les HSH dans les pays à faible revenu, amfAR, la Fondation pour la Recherche sur le VIH/SIDA, a lancé l'Initiative HSH qui a pour but de:

- **Soutenir et aider les organisations HSH locales** – Aider les groupes HSH à créer et maintenir des endroits sans discrimination; faire le plaidoyer et fournir l'accès à l'information et l'éducation sur le VIH/SIDA, ainsi qu'aux services de prévention.
- **Développer une prise de conscience de l'épidémie de VIH/SIDA parmi les HSH** – Aider les HSH à apprendre plus sur le VIH/SIDA, partager les meilleures méthodes, et utiliser des résultats de recherches pour créer un soutien politique et communautaire.
- **Essayer d'assurer plus de législation et un accroissement de financement pour aider les communautés touchés par le SIDA** – Assister les efforts locaux, régionaux, et internationaux pour combattre la discrimination et la criminalisation; augmenter l'accès aux soins sanitaires; faire du VIH/SIDA parmi les HSH une priorité de financement mondial de santé publique.

Programme de subvention

L'Initiative HSH fournira de petites subventions ciblées aux organisations locales dans les pays à faible revenu pour donner meilleur accès aux services de prévention, traitement, soins, et soutien pour les HSH. La subvention sera également utilisée pour stimuler une plus grande collaboration entre les organisations, parmi lesquelles elle soutiendra les efforts pour l'échange des informations, pour viser les nouveaux problèmes, pour assurer le travail collectif pour concevoir et fournir des services plus efficaces de VIH/SIDA pour les HSH. Cette subvention aura un impact mesurable et immédiat pour les HSH vivant dans des communautés pauvres à faible revenu. De plus, des subventions comme celles ci peuvent avoir un « effet multiplicateur » ; elles aident à attirer des financements d'autres bailleurs de fonds.

Programme de plaidoyer

L'initiative HSH soutiendra les efforts mondiaux de plaidoyer visant une augmentation de financement des agences internationales, des gouvernements locaux et nationaux et des organisations non gouvernementales pour les services de prévention, traitement et prise en charge du VIH/SIDA pour les HSH. Également, le programme de plaidoyer aidera

“Moins d'un HSH sur 20 hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes a accès aux services de prévention, de traitement et de prise en charge dont il a besoin.”

– Rapport mondial 2006 de l'ONUSIDA sur l'épidémie du SIDA

les efforts d'organisations locales et internationales visant à abolir le stigma, la discrimination et la violence qui menacent la vie des HSH et alimentent la propagation du VIH/SIDA.

amfAR en Asie du Sud Est: Faisant déjà une différence pour les HSH

Le rapport 2006 de amfAR, *HSH et le risque au VIH/SIDA en Asie : Qu'est ce qui alimente l'épidémie parmi les HSH et comment est ce que nous pouvons y mettre fin ?*, a attiré l'attention sur l'ampleur de l'épidémie du VIH/SIDA parmi les HSH en Asie. Le programme amfARTREAT Asia travaille avec les organisations HSH dans la région depuis 2005 et sert actuellement de secrétariat régional pour le réseau « Purple Sky.» Ce réseau est une collaboration d'organisations locales et de délégués de gouvernement, soutenu par USAID et CDC US, travaillant sur les interventions de VIH pour les HSH dans la sous région de Mékong. Quand le réseau a commencé ses activités, un seul des six pays dans la région savait que les HSH étaient une population vulnérable ayant besoin, dans le plan national de SIDA, de programmes et services spécifiques. Aujourd'hui les six pays reconnaissent l'importance de viser le VIH/SIDA auprès des HSH.

Une opportunité pour sauver des vies

L'incapacité du monde à mettre fin à la diffusion de l'infection VIH/SIDA parmi les HSH est l'une des grandes défaillances de santé publique dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le déni, la discrimination, et la criminalisation sont à la base de cet échec.

Pourtant on a raison d'espérer : les organisations locales ont affrontés le problème depuis le début de la pandémie du VIH/SIDA, fournissant des services aux populations vulnérables et demandant—et obtenant—plus d'aide des gouvernements. Avec suffisamment de financement, ces organisations peuvent transformer l'attitude communautaire, conduire le changement des politiques, et mobiliser des financements nécessaires pour arrêter la diffusion alarmante du VIH/SIDA parmi les HSH à travers le monde.

L'Initiative HSH fournira un leadership et des ressources vitales pour le succès de ce mouvement local.

Les programmes de prévention du VIH pour les HSH sont bloqués par:

- Le déni que l'activité sexuelle entre les hommes existe.
- La stigmatisation et la criminalisation des relations sexuelles homme-homme.
- Des informations épidémiologiques insuffisantes.
- La difficulté de contacter beaucoup d'HSH.
- Des installations sanitaires insuffisantes.
- Un manque d'intérêt parmi les donateurs pour des programmes de prévention pour les HSH.
- Le manque d'attention prêté aux HSH dans les plans nationaux pour le SIDA.

Le SIDA chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, Mise à Jour technique de l'ONUSIDA, 2000.

DATA SOURCES

Beyrer C. *HIV Epidemiology Update and Transmission Factors: Risks and Risk Contexts*. XVI International AIDS Conference, Toronto; 2006.

Garcia de Leon-Moreno C, Diaz Betancourt A, Izazola Licea JA. Changing direction to the public policy that centers the disease: the MSM task force and HIV/AIDS in Mexico. *Int Conf AIDS*. 2004; abstract no. E11068.

Johnson CA. *Off the Map: How HIV/AIDS Programming is Failing Same-Sex Practicing People in Africa*. International Gay and Lesbian Human Rights Commission; 2007.

Montano SM et al. Prevalence, genotypes and risk factors for HIV transmission in South America. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*. 2005; 40 (1): 57-64.

Ottosson D. *State-Sponsored Homophobia: A World Survey of Laws Prohibiting Same-Sex Activity Between Consenting Adults*. International Lesbian and Gay Association; 2007.

Wade AS et al. HIV infection and sexually transmitted infections among men who have sex with men in Senegal. *AIDS*. 2005;19:2133-2140.

UNAIDS. *Report on the Global AIDS Epidemic*. 2006.

UNAIDS. *A scaled response to AIDS in Asia and the Pacific*. 2005.

US Centers for Disease Control and Prevention. *CDC HIV/AIDS Fact Sheet: HIV/AIDS Among Men who Have Sex with Men*. May 2007.